

Cuándo Vacunar a Niños y Adolescentes

Grupo de edad	Hep B hepatitis B	DTP difteria, tétanos, tos ferina (tos convulsa)	Poliomielitis	MMR sarampión, paperas, rubéola	Hib <i>Haemophilus influenzae tipo b</i>	Varicela	PCV vacuna contra los neumococos	Hep A hepatitis A	MCV4 Vacuna antimeningocócica conjugada	Rotavirus	HPV Virus del Papiloma Humano	Gripe (vacuna antigripal)
Nacimiento	✓											
2 meses	✓ 1 a 2 meses después de la primera inyección contra la hepatitis B	✓	✓		✓		✓			✓		
4 meses		✓	✓		✓		✓			✓		
6 meses		✓			✓		✓			✓		
12 a 18 meses	✓ 6-18 meses	✓ 15 a 18 meses	✓ 6 a 18 meses	✓ 12 a 15 meses	✓ 12 a 15 meses	✓ 12 a 18 meses	✓ 12 a 15 meses	✓✓ 2 inyecciones con un intervalo de por lo menos 6 meses				
4 a 6 años		✓	✓	✓		✓						✓ Cada otoño*
11 a 12 años	✓✓✓ 3 inyecciones si el niño no recibió inyecciones con anterioridad	✓				✓✓ 2 inyecciones si el niño no recibió la vacuna con anterioridad o no contrajo la enfermedad			✓ Si el niño no recibió la vacuna entre los 11 y 12 años, darle la vacuna al ingresar a la escuela secundaria (15 años)		✓✓✓ 3 inyecciones a intervalos de 0, 2 y 6 meses	
La ley del estado requiere estas vacunas para inscribirse en:	Jardín y 7° grado	Guardería infantil Desde jardín al 12° grado	Guardería infantil Desde jardín al 12° grado	Guardería infantil Desde jardín al 12° grado (Debe darse al cumplir un año o después)	Guardería infantil	Guardería infantil Jardín y 7° grado (Debe darse al cumplir un año o después)	Guardería infantil, de 2 a 24 meses					

Este programa de vacunación podría variar un poco, dependiendo de su médico específico y su niño.

Los niños de 2 años de edad y mayores pueden necesitar vacunas adicionales (p.ej. polisacárido neumocócico, polisacárido meningocócico o antigripal). Hable con su médico o clínica.

***Vacuna antigripal:** Todos los niños de 6 meses a 18 años de edad deben recibir una vacuna antigripal por año, especialmente aquellos que tienen factores de riesgo como asma y diabetes. Si un niño es menor de 9 años y recibe la vacuna antigripal por primera vez, necesitará 2 inyecciones con por lo menos 4 meses entre sí.

La ley de Minnesota requiere prueba escrita de ciertas vacunas para los niños que asisten a guarderías con licencia o a los grados K-12. Sin embargo, si un niño tiene una razón médica o si sus padres están concienzudamente opuestos a alguna o todas las vacunas, existe una exención legal disponible. Para solicitar una exención debe completar un formulario que puede obtener en centros de guardería y escuelas.



Immunization Program
P.O. Box 64975
St. Paul, Minnesota 55164-0975
651-201-5503, 1-800-657-3970
www.health.state.mn.us/immunize

When to Get Shots for Children & Adol/Spanish
IC#141-1139 (3/2008)

